

26. *Brumus frater* Weise.

Je rapporte à cette espèce, d'après la description, deux exemplaires pris par M. Bastard à Majunga, et un certain nombre de spécimens pris par moi à Diego-Suarez non loin de la mer. L'espèce est décrite de Féné-rive.

SUPPLÉMENT À LA LISTE DES ESPÈCES DES GENRES ZONOPTERUS ET PACHY-  
TERIA (COLÉOPTÈRES LONGICORNES) DE LA COLLECTION DU MUSÉUM  
D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS.

PAR C. RITSEMA CZ.

CONSERVATEUR AU MUSÉE DE LEYDE.

*Zonopterus unifasciatus* n. sp.

Une ♀ de Hué : Annam (R. P. Renaud).

Ressemble au *Zonopterus magnificus* Bates<sup>(1)</sup> et *Bosscæ* Rits.<sup>(2)</sup>, de Bor-néo, étant d'un noir bleuâtre avec une large bande transversale fauve sur les élytres et ayant la moitié apicale des antennes de cette même couleur, mais bien distinct. Ressemble également au *Callichroma? Davidis* H. Deyr.<sup>(3)</sup>, de la Chine centrale, mais l'espèce nouvelle est plus massive, le pronotum est densément pubescent, la distribution des couleurs aux antennes est diffé-rente, etc.

Longueur, de la base des antennes jusqu'au bout des élytres, 26 milli-mètres; longueur des élytres, 20 millimètres; largeur des élytres aux épaules, 8 millimètres; la plus grande largeur du prothorax (entre les tubercules latéraux), 7 millimètres.

D'un noir bleuâtre un peu violacé, plus clair sur les pattes et le dessous du corps, avec une large (6 millim.) bande transversale fauve, à bords irrégulièrement ondulés, sur la moitié basilaire des élytres, de manière que le bord postérieur de la bande se trouve justement au milieu de la lon-gueur des élytres; les sept derniers articles des antennes ainsi que le côté externe du 4<sup>e</sup> et une petite tache au sommet du côté externe du 3<sup>e</sup> article de la même couleur fauve.

Les parties bleuâtres du dessus sont couvertes d'une fine pubescence noire, hérissée sur le pronotum, veloutée sur l'écusson et les élytres; sur la bande fauve des élytres, on remarque une fine pubescence claire et soyeuse; le dessous du corps a des reflets soyeux noirâtres; les pattes sont presque glabres à l'exception du côté inférieur des fémurs et des tibias, qui est den-

(1) *Proceed. Zool. Soc. London*, 1889, p. 391.

(2) *Notes Leyden Museum*, XVI, 1894, p. 107.

(3) *Ann. Soc. Ent. France*, (5) VIII, 1878, p. 132, pl. III, fig. 8.

sément couvert d'une pubescence hérissée noire; les tibias et les tarses des pattes antérieures sont couverts d'une pubescence fauve, sauf sur le bord externe des tibias où elle est peut-être usée; le dessous des quatre premiers articles des tarses est fauve.

La tête est relativement petite; la face est couverte d'une ponctuation forte, plus serrée vers le sommet, où elle devient même confluyente; celle du labre, des mandibules et de la partie entre les yeux et les mandibules est plus fine et plus espacée; derrière la base des yeux on observe un espace rugueux; une ligne impressionnée s'étend de la base du clypeus jusque entre les lobes supérieurs des yeux, où elle se trouve dans un petit espace lisse. Les antennes n'atteignent pas le bout des élytres; le 1<sup>er</sup> article est court, finement mais très densément ponctué, non épineux à son extrémité; le 3<sup>e</sup> environ de la longueur des 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> réunis, le 4<sup>e</sup> et les suivants subégaux en longueur, les 5<sup>e</sup> au 10<sup>e</sup> dentés en scie extérieurement.

Bords antérieur et postérieur du prothorax presque droits, le premier muni d'une frange noire très épaisse; les côtés fortement anguleux au milieu, sinués dans leur moitié antérieure, convexes dans leur moitié postérieure; la surface est rugueuse, avec une ligne médiane glabre largement interrompue au milieu et une légère impression transversale au tiers de sa longueur. Écusson en triangle, un peu allongé, subacuminé au bout, les côtés relevés.

Élytres graduellement mais peu sensiblement rétrécis jusqu'à l'extrémité, largement arrondis aux épaules et à l'extrémité, avec l'angle sutural émoussé. La sculpture est extrêmement fine et serrée, entremêlée, sur la bande fauve, de petits points distincts; les trois côtes ordinaires sont plus distinctes sur la bande fauve que sur les parties bleuâtres.

Le dessous de la tête (sauf la gorge qui est lisse) et le prosternum sont rugueux, le dernier pubescent; le métasternum et l'abdomen, sans ponctuation visible; le 5<sup>e</sup> segment ventral (le dernier) montre une échancrure de chaque côte et une troisième, à peine visible, au milieu du bord postérieur.

Les fémurs sont assez finement mais densément ponctués, les postérieurs atteignent presque l'extrémité des élytres; les tibias postérieurs sont comprimés et un peu sinueux, les tarses postérieurs allongés.

*PACHYTERIA FASCIATA* Fabr.

Une ♀ des Indes orientales (Coll. de Marseul).

*PACHYTERIA DIMIDIATA* Westwood. *Cabinet of Orient. Entom.*, 1848, p. 60, tab. XXIX, fig. 8.

Un ♂ de Bien-Hoa : Cochinchine (Coll. de Marseul).